


隨著醫療科技進步，化學治療不再侷限於醫院，在家也能以攜帶式輸液器（俗稱化療奶瓶）來注射化療，藥物劑量與住院相同，將含有化療藥物的化療奶瓶銜接於病人中心靜脈管路，物品方便攜帶且輕巧，可放入口袋或專用腰包內，日常生活不受影響，不會因為等候病床而延遲治療。

一、接受居家化療注意事項

為維持藥物注射安全，接受居家化療期間，請您遵守以下注意事項：

(一) 管路照護：

1. 管路卡夾為開啟狀態。
2. 管路無壓迫或纏繞。
3. 睡覺時腰包放在注射同側腰部處。
4. 注射部位有無紅腫熱痛、保持乾燥、膠布黏貼固定無滑脫。



(二) 居家活動：

1. 建議穿著寬鬆前釦式衣物，穿脫衣服時注意不可以拉扯管路。
2. 攜帶式輸液器不可接觸熱源如：暖爐、電熱器等，因為會因環境溫度變高而使滴注時間變快。
3. 注射部位該側禁止搬重物及劇烈運動如跑步。
4. 居家化療期間可以泡澡及淋浴，但要避免洗澡水直接沖洗及噴濺到注射部位。

著寬鬆前扣衣物



不可接觸熱源



禁止搬重物




不可沖洗及噴濺



(三)其他注意事項：

1. 每日早、中、晚檢查輸注狀態，容器內的儲藥囊會隨著輸注時間變小，當儲藥囊呈長條狀且表面有突出顆粒時，表示已輸注完畢，可返院移除。



2. 輸注結束時間若大於 2 小時或小於 2 小時為正常，但超過 5 小時為異常情形，須返院。
3. 化療腰包內為避免藥品滲漏，勿置放其他物品。
4. 化學治療藥物的代謝通常 48 小時後經由糞便及尿液排出，如廁後須蓋上馬桶蓋後，連續沖水兩次，避免化療代謝物飄散於空氣中。

四、以下狀況須立即返院處理：

- (一)管路滑脫：彎針滑脫立即關閉管夾，以塑膠袋密封彎針及攜帶式輸液器。
- (二)藥物外滲：注射部位出現紅、腫、熱、痛或感覺異常(刺、麻)等症狀，或注射部位有出血、滲液，請立即關閉管夾。
- (三)藥物外灑：攜帶式輸液器發生破裂或脫落，立即關閉管夾、戴手套用塑膠袋密封。

若有問題請隨時提出，護理人員非常樂意為您服務，任何疑問可利用馬偕醫院門診化療諮詢專線：台北(02)25433535 轉 7262、淡水(02)28094661 轉 2943、台東(089)310150 轉 501，諮詢時間：週一至週五上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00。

祝您 平安健康