

หนังสือแจ้งความยินยอมการผ่าตัดต่อกระจก

เลขทะเบียนผู้ป่วย:

ชื่อ:

ห้อง:

หน้า:

หนังสือฉบับนี้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์และความเสี่ยงรวมถึงทางเลือกอื่นๆในขั้นตอนการผ่าตัด(หรือการแทรกแซงทางการแพทย์)ให้ผู้ป่วยทำความเข้าใจและอ่านข้อมูลอย่างละเอียดหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนนี้ กรุณาขอคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนตัดสินใจลงนามในเอกสารยินยอมฉบับนี้เจ้าหน้าที่แพทย์ยินดีที่จะตอบและไขข้อสงสัยทุกประการ

ขั้นตอนการผ่าตัด (หรือการปฏิบัติทางการแพทย์) :

ระบุคำชี้แจงก่อนเข้าการผ่าตัด: ต้อกระจก

วัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับประสิทธิภาพความเสี่ยงและทางเลือกในการผ่าตัด กระบวนการที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเนื้อหาข้อมูลที่สำคัญสำหรับแพทย์และผู้ป่วยต้องเข้าใจถึงข้อมูลนี้อย่างละเอียด

ดังนั้นโปรดอ่านเอกสารฉบับนี้ให้อย่างละเอียดหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนนี้ให้รีบปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะลงนามในแบบฟอร์มยินยอมฉบับนี้ ระบุในขั้นตอนการผ่าตัด: ต้อกระจก

ปัญหาทั่วไปซึ่งนอกเหนือจากการเสื่อมสภาพของต้อกระจกแล้วผู้ป่วยยังประสบกับปัญหาในการเคลื่อนไหวอย่างอิสระจึงจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด การผ่าตัดต้อกระจกเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยต้องรับทราบ รวมถึงอาการที่เริ่มก็ตามการแนะนำของแพทย์ควรใส่เลนส์ธรรมชาติจะดีต่อสายตามากกว่าเลนส์เทียม

เมื่อเกิดอาการต้อกระจกผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์และพิจารณาด้วยตนเองว่าจะเข้ารับการผ่าตัดหรือไม่ การตัดสินใจในการเข้ารับการผ่าตัดนั้นจะทำตามวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลและมีการพิจารณาจากแพทย์

เมื่อผู้ป่วยเข้าห้องตรวจแพทย์จะทำการตรวจวัดชีพจรก่อนจะใช้ยาระงับความรู้สึกเพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย ตามประเภทยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ใช้สำหรับการผ่าตัดโดยทั่วไป

1.การหยดยาเฉพาะที่ : การหยดยาขาลงผนังตาเป็น การใช้ยาเฉพาะที่จะไม่ทำให้คนไข้มีอาการเจ็บปวดแต่ก็ยังคงรับรู้ถึงอาการกดดันหรือเกร็งได้ซึ่งยาตัวนี้มีอาการคล้ายกับการใช้ยาหยดตาโดยทั่วไปภายใต้การระงับความรู้สึกเฉพาะที่ผู้เข้ารับการรักษายังสามารถมองเห็นและมีความรู้สึกในร่างกายส่วนอื่นๆและรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงในระหว่างการผ่าตัดและยังรู้สึกถึงความชุ่มชื้นในดวงตาหลังจากการหยดยาและยังสามารถมองเห็นแสงของกล้องจุลทรรศน์เพื่อพร้อมที่จะทำการผ่าตัดและผู้ป่วยต้องรักษาสมดุลให้นิ่ง

2.การฉีดยาเฉพาะที่: มีชนิดๆแรกจะฉีดกล้ามเนื้อดวงตาและตาเปลือกตา และการฉีดยาตรงขากรไกโร การฉีดยาตรงสองจุดนี้คือได้ตาและเปลือกตา จะทำให้กล้ามเนื้อของเปลือกตาและการฉีดยาตรงจุดนี้จะช่วยหยุดความรู้สึกของดวงตาและไม่ให้ดวงตาเคลื่อนไหวในระหว่างการผ่าตัดก่อนที่จะฉีดยาเฉพาะที่แพทย์จะทำการอธิบายในอาการที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าให้ผู้เข้ารับการรักษาเข้าใจ อย่างละเอียด

(โดยเครื่องเลเซอร์จะทำงาน โดยใช้เทคโนโลยีการสแกนพื้นผิวภายนอก)ปรากฏในกล้อง ชุดเครื่องมือวิเคราะห์วางแผนก่อนผ่าตัดด้วยระบบดิจิทัลซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลัก คือ

การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีโดยวิธีการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงสลายต้อกระจกในดวงตกลายเป็นผงละเอียดและดูดออกจากดวงตาหลังจากที่ดูดผงออกจากต้อกระจกก็จะทำการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมทดแทนลงไป วัตถุประสงค์ในการใช้เลนส์แก้วตาเทียมขนาดเล็ก

(หรืออาจเป็นพลาสติกหรืออื่น ๆ) จะถูกทิ้งไว้ในสายตาอย่างถาวร แผลที่ผ่าตัดโดยปกติจะมีขนาดเล็กมากโดยที่ไม่ต้องเย็บเพื่อปิดแผล

ซึ่งแจ้งประสิทธิภาพของการศัลยกรรม:(ขั้นตอนต่อไปนี้อาจรักษาด้วยการผ่าตัดอย่างไรก็ตามแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดและโรงพยาบาลไม่สามารถรับประกันประสิทธิภาพใดๆจะขึ้นอยู่กับทัศนคติใจของคนไข้และพิจารณาหลังจากที่เข้าใจถึงประโยชน์และความเสี่ยงในการรักษาอย่างละเอียด)

ผู้ป่วยอาจได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

แพทย์ผู้ชำนาญจะไม่มีการรับรองการรักษาผู้ป่วยสามารถตัดสินใจเองว่าผลประโยชน์และความเสี่ยงนั้นคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรก็ตามอาจมีความเสี่ยงอื่นๆซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลตามด้านล่างนี้

1.การตรวจบำบัดเพื่อปรับปรุงความชัดเจนของวิสัยทัศน์คนไข้

2.การตรวจบำบัดโดยจักษุแพทย์เพื่อปรับปรุงและเพิ่มทัศนวิสัยของคนไข้

ความเสี่ยงในการผ่าตัด: (ไม่มีขั้นตอนการผ่าตัดหรือการแทรกแซงทางการแพทย์) ที่ปราศจากความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ดังต่อไปนี้หากได้ทำความเข้าใจในข้อมูลอย่างละเอียดแล้วแต่อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดบางอย่างอาจเกิดขึ้นที่ไม่รวมอยู่ในขั้นตอนข้างล่างนี้)

I. ขั้นตอนความเสี่ยงโดยทั่วไป:

- a. บางส่วนของปอดบวมและเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
- b. อาจจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะและกายภาพบำบัด
- c. อาการปวดบวมที่ขาเกิดจากการอุดตันก่อนเลือด
- d. อัตราส่วนน้อยที่ก้อนเลือดแตกไปอุดตันปอดซึ่งอาจมีโอกาถึงแก่ชีวิตได้
- e. อาการหัวใจวายเนื่องจากความเครียดหรือโรคหลอดเลือดสมองแตก
- f. ขั้นตอนการผ่าตัดที่อาจทำให้เสียชีวิตได้

II: ความเสี่ยงในขั้นตอนการผ่าตัดนี้:

การปฏิบัติทางการแพทย์และขั้นตอนการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความเสี่ยงในระดับหนึ่งก่อนที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ต้องทำความเข้าใจกับความเสี่ยงในขั้นตอนการผ่าตัดและภาวะแทรกซ้อนอาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันในระหว่างหนึ่งสัปดาห์หรือเป็นเดือนและอาจถึงปีก็เป็นไปได้ อาการต่อไปนี้เป็ความเสี่ยงที่ระบุไว้อย่างชัดเจนแต่ยังคงมีความเสี่ยงที่แพทย์ไม่สามารถระบุไว้ด้านล่างนี้ได้

1. ดวงตามีบาดแผล
2. เส้นประสาทตาเกิดความเสียหาย
3. การกระทบของระบบไหลเวียนโลหิตต่อตา
4. อาจเกิดหนังตาตก
5. ระบบทางเดินหายใจผิดปกติ
6. ความดันโลหิตต่ำ
7. มีเลือดออกเปลือกตาและกรามล่างบวมซ้ำ

8. อาจทำให้เสียชีวิตได้ในกรณีพิเศษที่ต้องให้ยาชาทั่วไป

ระบุถึงภาวะแทรกซ้อนในการระบุรับความรู้สึกของดวงตา แต่ไม่รวมถึง อาการดังต่อไปนี้:

1. อาการปวดและระคายเคืองของร่างกายในส่วนต่างๆ
2. อาการตกเลือด บวมซ้ำ ดวงตาแดง เลือดออกในตาและเปลือกตา
3. ปฏิกริยาภูมิแพ้หรือผลข้างเคียงจากยาที่ไม่พึงประสงค์
4. การติดเชื้อ ตาอักเสบ(การติดเชื้อในลูกตา)

ระบุถึงภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดคือกระจก แต่ไม่รวมถึง อาการต่อไปนี้:

5. เกิดบาดแผล
6. หนังตาหย่อนคล้อย และเปลือกตาบวม
7. ต้อกระจกตาบวม(การสูญเสียความคมชัดของกระจกตา) เปลี่ยนถ่ายกระจกตา
8. อักเสบเรื้อรัง (อักเสบ)หรือไวต่อแสง
9. การคำนวณเลนส์ผิดพลาดขณะเปลี่ยน
10. การคลาดเคลื่อนตำแหน่งของเลนส์
11. ความดันในลูกตาเพิ่มขึ้น หรือ ต้อหิน
12. อาการที่มีอยู่เลวร้ายขึ้น เช่น โรคเบาหวาน จอประสาทตาเสื่อม ต้อหิน
13. ต้อกระจกเร็ว
14. ชิ้นส่วนของต้อกระจกแตกกระจายเข้าไปในเลนส์ต้อตา
15. จุดรับภาพจอประสาทตาแตกเร็ว
16. การก่อก้อนเยื่อหุ้มเซลล์จอประสาทตา
17. อาการบวมน้ำของจอประสาทตา (ม่านตาบวมน้ำ)
18. การฉีกขาดม่านตา
19. วัุ่นตาเสื่อมสภาพและวัุ่นตาลอกตัว
20. ต้องใช้แว่นตาหรือคอนแทกเลนส์หลังการผ่าตัด
21. อาจต้องเลเซอร์หรือผ่าตัด หากม่านตาตันในเกิดมีวัุ่นในตา
22. มองเห็นภาพซ้อน

23. ความไวต่อแสง มีจุดดำในตา และการมองเห็นภาพซ้อน หรือภาพเบลอ

24. ไม่สามารถคืนสภาพของความคมชัดของสายตาได้ใน อัตรา 20 ต่อ 20 ราย

25. อาจมีการผ่าตัดเพิ่มเติม

26. สูญเสียการมองเห็น

27. การสูญเสียลูกตา

หากมีข้อสงสัยในคำถามใด ๆ ในข้อมูลเนื้อหา นี้ โปรดปรึกษาและทำความเข้าใจและขอคำแนะนำจากแพทย์

※ อาจมีผู้ป่วยบางรายที่จะมีโอกาสเกิดโรคต่างๆขึ้นในระหว่างการผ่าตัด

ทางเลือก : โรงพยาบาลขอเสนอทางเลือกในการผ่าตัด (หรือการปฏิบัติทางการแพทย์) ดังที่แสดงไว้ด้านล่างหากคุณตัดสินใจที่จะไม่ยอมรับขั้นตอนการผ่าตัดที่นำเสนอ (หรือการแทรกแซงทางการแพทย์) ที่อาจจะเกิดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน แพทย์ก่อนที่จะตัดสินใจลงนามในขั้นสุดท้าย)

ข้อควรพิจารณาของตัวเลือก:

ทางเลือกในการผ่าตัดต่อกระจก ได้แก่:

1. ให้สังเกตอาการอย่างต่อเนื่อง (เดือนการผ่าตัดแล้วค่อยเข้าดำเนินการ) มีแนวโน้มว่าต่อกระจกมีการเปลี่ยนแปลงหรือเลวร้ายลงในช่วงนี้หรือไม่

หากไม่แน่ใจในการตัดสินใจกับข้อมูลขั้นตอนที่เกี่ยวข้องหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะได้รับหรือทางเลือกอื่น ๆ ในการดำเนินการนี้ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะลงนามในแบบฟอร์มความยินยอม

คำแนะนำเพิ่มเติมจากแพทย์: _____

(ผู้ป่วยหรือสมาชิกในครอบครัว) แนะนำถึงประโยชน์ความเสี่ยงและทางเลือกในการรักษาอื่น ๆ ของกระบวนการผ่าตัด (หรือการแทรกแซงทางการแพทย์) กับแพทย์และขอความเห็นชอบในการรักษา ผู้เข้ารับรักษาได้เข้าใจคำแนะนำและคำอธิบายทั้งหมดของแพทย์อย่างครบถ้วนและผู้ป่วยได้รับหนังสือข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้เรียบร้อยแล้ว

จากคำแถลงข้างต้นข้าพเจ้าต้องการดำเนินการนี้

ลายเซ็นของผู้ป่วยที่มีความยินยอม: _____ ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย: _____

ลายเซ็นของพยาน (เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ (ชื่อโรงพยาบาล) หรือญาติผู้ป่วย : _____

ลายเซ็นของแพทย์:

วันที่: ____/____/____

เวลา: ____/____/____