



點滴注射須知

2000.07 制定
2020.12 修訂

- 1.護理人員已將點滴流速調整好，請勿自行關閉點滴或調整滴注速度，以免影響藥物作用及病人的安全。
- 2.注射部位有紅、腫、熱、痛或任何不適時，請立即通知護理人員處理。
- 3.點滴注射時若有血液回流或滴注不順暢，請立即通知護理人員處理。
- 4.點滴注射時，請勿折到或拉扯點滴管路。
- 5.注射部位於關節處時，請勿彎曲該關節。
- 6.注射點滴的肢體只要在不影響點滴滴注功能情況下，仍可以執行日常活動。
- 7.洗澡時請避免弄濕注射部位。
- 8.若需下床活動時，請使用活動點滴架，點滴瓶的位置請高於注射部位約 50 公分。
- 9.若點滴瓶與管路鬆脫時，請勿自行插回，需立即通知護理人員處理。
- 10.為了您的安全，點滴注射期間，請勿離開醫院。
- 11.拔除點滴後，需注意注射部位傷口有無紅、腫、熱、痛、化膿或出血，若有以上情形，請立即通知護理人員處理。

若有問題請隨時提出，護理人員非常樂意為您服務，出院後如有任何疑問，可利用馬偕醫院健康諮詢專線—台北/淡水馬偕(02)25713760、新竹馬偕 (03)5745098、台東馬偕(089)310150 轉 311，諮詢時間：週一至週五上午 9:00-12:00，下午 14:00~17:00。

祝您 平安健康